Mode d'emploi

Hydrosorb Gel est un hydrogel transparent, visqueux et stérile, composé d'eau avec teneur en électrolytes identique à celle d'une solution de Ringer, de glycérine, d'hydroxyéthylcellulose, de cellulose et de carbomère. Hydrosorb Gel ne contient pas de polyéthylène glycol.

Propriétés et mode d'action

Hydrosorb Gel maintient un environnement humide propice à la cicatrisation.

Selon l'état de la plaie, Hydrosorb Gel ramollit les tissus nécrotiques desséchés, favorise leur élimination et permet d'absorber les débris nécrotiques et les exsudats des plaies faiblement exsudatives.

Hydrosorb Gel peut être éliminé par rinçage de la plaie avec une solution isotonique type solution de Ringer ou toute autre solution de rinçage stérile adaptée, sans perturber le processus de cicatrisation ni léser les tissus néoformés.

Au début du traitement avec Hydrosorb Gel, l'élimination des tissus ayant subi des lésions irréversibles peut dans quelques cas conduire à un agrandissement de la plaie. D'une manière générale, ce phénomène témoigne du processus de cicatrisation en cours de la plaie.

Indications

Hydrosorb Gel est recommandé dans la détersion de la plupart des plaies superficielles et profondes, par exemple les ulcères, les escarres de décubitus et autres plaies peu exsudatives.

Le gel contribue à l'humidification et à l'hydratation des plaies nécrotiques. Grâce à la création d'un milieu humide à la surface de la plaie, Hydrosorb Gel favorise le débridement autolytique et l'élimination des tissus nécrotiques.

Application

1. Application d'Hydrosorb Gel

- Nettoyer la plaie avec une solution isotonique stérile type Ringer ou toute autre solution de rinçage stérile adaptée. Sécher avec soin la peau environnante.
- Sortir la seringue stérile du protecteur individuel et retirer le bouchon de protection.
- Sans toucher le lit de la plaie avec l'embout de la seringue, appliquer une couche de gel d'au moins 5 mm d'épaisseur sur toute la surface de la plaie.
- Recouvrir la plaie avec un pansement secondaire adéquat.
- Le contenu de la seringue ne doit pas être utilisé pour plusieurs patients.
- Jeter le gel inutilisé restant de la seringue.

2. Retrait d'Hydrosorb Gel

- Pour enlever Hydrosorb Gel de la plaie, rincer soigneusement avec une solution isotonique stérile type Ringer ou toute autre solution de rinçage stérile adaptée.
- La fréquence des changements de pansements dépend du type de plaie.
- Hydrosorb Gel peut rester en place jusqu'à 3 jours.
- Hydrosorb Gel doit être changé en cas de fuites au travers du pansement secondaire.

Contre-indications

- Hydrosorb Gel ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une allergie à un des composants.
- Ne pas utiliser sur des brûlures du 3e degré.

Précautions d'emploi

- Pour usage externe seulement.
- Les plaies infectées doivent être contrôlées quotidiennement par un médecin et faire l'objet d'un traitement systémique adapté. Les changements de pansements doivent être effectués selon la recommandation du médecin. L'utilisation d'Hydrosorb Gel sur les plaies infectées peut être poursuivie sous surveillance médicale.

Remarques particulières

Conserver Hydrosorb Gel entre 5 °C et 40 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité. Ne pas congeler. Ne pas utiliser si la seringue est endommagée ou ouverte. Ne pas restériliser. Tenir hors de portée des enfants.

Date de dernière révision de la notice : 2011-03

PRAXISDIENST
Matériel médical depuis 1953
Commandez ici !

FR – Lab. PAUL HARTMANN S.à.r.l. · Châtenois · 67607 Sélestat CEDEX
BE – N.V. PAUL HARTMANN S.A. · 1480 Saintes/Sint-Renelde